

Tabelle 1: Impfkalender (Standardimpfungen) für Säuglinge, Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Impfung	Alter in Wochen	Alter in Monaten										Alter in Jahren							
		6	2	3	4	5–10	11*	12	13–14	15	16–23	2–4	5–6	7–8	9–14	15–16	17	ab 18	ab 60
Rotaviren	G1 ^a		G2	(G3)															
Tetanus ^b		G1	N	G2	N	G3 ^c		N						N	A2	N		A ^e	
Diphtherie ^b		G1	N	G2	N	G3 ^c		N						N	A2	N		A ^e	
Pertussis ^b		G1	N	G2	N	G3 ^c		N						N	A2	N	A3 ^e	N	
Hib ^b <i>H. influenzae</i> Typ b		G1	N	G2	N	G3 ^c		N						N					
Poliomyelitis ^b		G1	N	G2	N	G3 ^c		N						N	A1		N		
Hepatitis B ^b		G1	N	G2	N	G3 ^c		N						N					
Pneumokokken ^b		G1	N	G2	N	G3 ^c		N											S ^g
Meningokokken C							G1		N					N					
Masern								N		G1		N		N			S ^f		
Mumps, Röteln									N		G1		N						
Varizellen									N		G1		N						
HPV Humane Papillomviren															G1 ^d	G2 ^d	N		
Herpes zoster																		G1 ^h	G2 ^h
Influenza																		S ^j (jährlich)	
COVID-19																		G1 ⁱ , G2 ⁱ , A1 ⁱ	S ^j

Erläuterungen

- G

Grundimmunisierung
(in bis zu 3 Teilimpfungen G1 – G3)
- A

Auffrischimpfung
- S

Standardimpfung
- N

Nachholimpfzeitraum (Grund- bzw. Erst-
immunisierung aller noch nicht Geimpften
bzw. Komplettierung einer unvollständigen
Impfserie)
- a

Erste Impfstoffdosis bereits ab dem Alter von 6 Wochen, je nach verwendetem Impfstoff 2 bzw. 3 Impfstoffdosen im Abstand von mind. 4 Wochen
- b

Frühgeborene: zusätzliche Impfstoffdosis im Alter von 3 Monaten, d.h. insgesamt 4 Impfstoffdosen
- c

Mindestabstand zur vorangegangenen Impfstoffdosis: 6 Monate
- d

2 Impfstoffdosen im Abstand von mind. 5 Monaten, bei Nachholimpfung beginnend im Alter ≥ 15 Jahren oder bei einem Impfabstand von <5 Monaten zwischen 1. und 2. Dosis ist eine 3. Dosis erforderlich
- e

Td-Auffrischimpfung alle 10 Jahre. Nächste fällige Td-Impfung einmalig als Tdap- bzw. bei entsprechender Indikation als Tdap-IPV-Kombinationsimpfung
- f

Einmalige Impfung mit einem MMR-Impfstoff für alle nach 1970 geborenen Personen ≥ 18 Jahre mit unklarem Impfstatus, ohne Impfung oder mit nur einer Impfung in der Kindheit
- g

Impfung mit PCV20 (Änderung vom 28.09.2023)
- h

Zweimalige Impfung mit dem adjuvantierten Herpes-zoster-Totimpfstoff im Abstand von mindestens 2 bis maximal 6 Monaten
- i

Impfabstand zwischen G1 und G2 ≥ 3 Wochen (je nach Zulassung des Impfstoffs), und Impfabstand zwischen G2 und A1 ≥ 6 Monate
- j

Wiederholte Auffrischimpfung in einem Mindestabstand von 12 Monaten zur letzten Antigenexposition, vorzugsweise im Herbst
- *

Impfungen können auf mehrere Impftermine verteilt werden. MMR und V können am selben Termin oder in 4-wöchigem Abstand gegeben werden.